No. 42

Nous soussignez commissaires nommez par l'academie Royalle de chirurgie, avons examiné deux observations envoyées par Mr. de la fargüe chirurgien juré a Bayonne. Dans la premiere il s'agit d'un depot sous l'angle de la machoire inferieure, s'etendant le long de la baze de la d. machoire jusque dans les interstices des muscles de la langue et de l'os hyoïde, et meme jusqu'a la voute du palais par derriere les apophises pterigoïdes. Ayant fait une ouverture suffisante sous l'angle de la machoire ou le pus quoyque profond s'est fait sentir, il a paru plusieurs sinus dans le fond de la playe dont les uns se perdoient entre les muscles voisins, et un autre s'ouvroit dans la bouche vers les apophises pterigoïdes. Par les incisions convenables aux sinus que la structure des parties luy a permis d'ouvrir, par l'usage de l'Eponge preparée dans les autres par les

ARC 50 n° 44

injections qui passoient de la playe dans la bouche, et par un pancement methodique il est en fin venu a bout de cicatriser le tout, apres avoir fait prendre au malade assez longtems des fondants et des purgatifs pour corriger et evacuer l'humeur dont le depot n'avoit peutetre eté qu'un simptome. Comme la methode qu'il a suivi nous paroist etre selon la bonne pratique nous pensons que cette observation peut etre mise par extrait dans les memoires de l'academie. 1.

La deuxieme observation fait le détail d'un dépôt simptomatique a l'Epaule d'une fille de huit mois, lequel a commencé en cette partie par une douleur vive acompagnée de fievre, et a eté suivi six semaines apres d'une suppuration dans toute la circonference de ~~l'epaule~~ la capsule qui envelope la tête de l'humerus, par les

differents absez qui se sont faits autour de l'articulation, et qu'il a ouvert, il etoit a presumer que l'articulation meme etoit cariée ce qu'il n'a découvert qu'après la mort de la malade: car il dit qu'ayant enlevé la peau a toute la circonference de l'épaule, il apperceut a la partie anterieure de la capsule un petit trou qui traversant l'articulation sortoit a la partie posterieure, qu'ayant detaché le bras il avoit trouvé la tête de l'humerus presqu'entierement dénuée de son cartilage, l'humerus exostosé jusqu'a sa partie moyenne et la cavité glenoïde vermoulue. Nous croyons que cette observation peut etre mise dans l'histoire de l'academie attendu qu'on y voit les simptomes qui caracterisent une pareille maladie, laquelle ne peut guerir

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

N. 19

que par l'amputation faite dans l'article

de bonne heure . 1.

Le Dran

De Gramond